

## FICHE D'INFORMATION SUR LES MÉDICAMENTS

# BÉVACIZUMAB

(bé-va-ci-zu-mab)

### **Autres appellations de ce médicament :**

Avastin<sup>MD</sup> (*marque de commerce*)

### **Présentation :**

Injection : Solution incolore pour injection dans la circulation sanguine.

### **Pourquoi devez-vous prendre ce médicament :**

Le bévacizumab est administré pour le traitement du cancer colo-rectal métastatique, et est à l'étude pour le traitement de plusieurs autres formes de cancer.

### **Comment devez-vous prendre ce médicament :**

Votre infirmière en chimiothérapie injectera ce médicament dans votre circulation sanguine pendant une période de 30 à 90 minutes.

### **Précautions :**

- Vous devez dire à votre médecin si vous prenez d'autres médicaments.
- Vous devez dire à votre médecin si vous souffrez d'autres troubles de santé, par exemple : hypertension artérielle, maladie cardiaque, trouble du rein ou trouble du foie.
- Certains patients peuvent présenter une réaction pendant la perfusion. Les symptômes peuvent comprendre une fièvre et des frissons, de la fatigue, des maux de tête ou une hypertension artérielle; les symptômes moins courants sont notamment des nausées, une démangeaison, des difficultés respiratoires, un larmoiement ou un gonflement de la gorge. Votre infirmière vous gardera sous observation, plus particulièrement au début, et le bévacizumab vous sera administré lentement. Si vous éprouvez des sensations ou des symptômes inhabituels, dites-le à votre infirmière dès qu'ils apparaissent.
- Ce médicament chimiothérapeutique ne doit pas être utilisé si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Il importe de discuter des méthodes contraceptives avec votre médecin (Note : Les pilules contraceptives seules ne sont pas recommandées comme méthode de contraception). Si vous êtes un homme qui prenez ce médicament, vos partenaires féminines doivent également utiliser une méthode contraceptive.
- Vous devez dire à votre médecin si vous avez la varicelle (ou avez récemment été en contact avec une personne qui avait la varicelle), le zona, un trouble du rein ou un trouble du foie. Ces situations pourraient influencer sur votre traitement à l'aide de ce médicament.
- En raison des risques accrus d'infection, communiquez avec votre médecin avant de recevoir un vaccin ou de subir des travaux dentaires ou une chirurgie.
- Ne prenez pas d'ASA sans en parler avec votre médecin et sans avoir son autorisation.
- Si votre médecin vous a conseillé de prendre de l'ASA pour prévenir les maladies cardiaques ou les infarctus, parlez-en à votre oncologiste (médecin spécialisé dans le traitement du cancer) avant de commencer le traitement.
- Ne prenez pas d'ASA (Aspirine<sup>MD</sup>, acide acétylsalicylique) si vous avez des maux de tête, une fièvre ou des douleurs occasionnelles; prenez plutôt de l'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup>). Plusieurs médicaments vendus sans ordonnance contiennent de l'ASA; demandez toujours l'avis de votre pharmacien avant de choisir un produit.

Pour plus de renseignements sur ce médicament, veuillez téléphoner à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière, ou au Service d'information sur le cancer, au 1-888-939-3333.

**EFFETS SECONDAIRES****PRÉVENTION****CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE****PLUS COURANTS :**

- Hypertension artérielle
- Nausées et vomissements
- Maux de tête
- Sensation de fatigue ou de faiblesse
- Diarrhées
- Ulcération de la bouche
- Perte d'appétit
- Réactions allergiques

- Votre médecin ou votre infirmière vérifiera votre tension artérielle.
- Prenez des médicaments contre les nausées et les vomissements.
- Buvez des liquides clairs. Prenez de l'air et reposez-vous.
- Voir le feuillet sur les *Nausées et vomissements*.
- Évitez les aliments chauds, épicés et frits. Limitez votre consommation d'aliments et de boissons contenant de la caféine.
- Maintenez une bonne hygiène buccale. Brossez-vous les dents avec une brosse à dents molle. Évitez les aliments chauds, épicés et acides.

- Au besoin, votre médecin pourra vous prescrire un médicament pour traiter votre hypertension artérielle.
- Si vous vomissez moins d'une heure après avoir pris des comprimés antiémétiques, vous pouvez prendre une autre dose. Téléphonez à votre médecin si les vomissements persistent pendant plus de 24 heures, ou les nausées pendant plus de 48 heures.
- Buvez beaucoup de liquide. Si les diarrhées persistent pendant plus de 24 à 48 heures, téléphonez à votre médecin. Voir le feuillet sur les *Diarrhées*.
- Dès que vous constatez la présence d'ulcérations dans votre bouche ou sur vos lèvres, communiquez avec votre médecin ou votre infirmière.
- Voir le feuillet sur les *Soins de la bouche*.
- Si vous avez des tremblements, des frissonnements, de la fièvre, un état d'essoufflement ou un gonflement, parlez-en immédiatement à votre infirmière.

**MOINS COURANTS :**

- Signes d'infection/fièvre, frissonnements, toux
- Baisse du nombre de globules blancs
- Saignements de nez
- Étourdissements, confusion
- Douleurs abdominales
- Constipation
- Douleurs musculaires
- Vomissements et toux avec présence de sang
- Protéines dans l'urine

- Limitez vos contacts avec les personnes malades ou atteintes d'un rhume. Reposez-vous souvent. Lavez souvent vos mains.
- Maintenez une alimentation à forte teneur en fibres et comportant des grains entiers, des fruits et des légumes crus. Faites tous les jours de l'exercice. Buvez beaucoup de liquide.
- Une analyse d'urine sera faite avant votre prochaine perfusion.

- Conservez un thermomètre à la maison. Apprenez à reconnaître les signes d'infection. **Téléphonez à votre médecin ou rendez-vous à l'urgence** immédiatement si votre température est supérieure à 38 °C ou 100 °F. Vous aurez peut-être besoin d'antibiotiques.
- Si vous présentez un saignement de nez qui ne cesse pas malgré l'application d'une pression pendant 10 à 15 minutes, téléphonez immédiatement à votre médecin ou à votre infirmière.
- Si cet effet est grave ou s'il persiste, communiquez avec votre médecin.
- Essayez les laxatifs naturels ou vendus sans ordonnance. Des suppositoires peuvent être utiles. Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Si vous n'avez pas eu de selles pendant trois jours, parlez-en à votre médecin. Voir le feuillet sur la *Constipation*.
- Si cet effet est grave ou s'il persiste, communiquez avec votre médecin.
- Communiquez avec votre médecin ou rendez-vous à l'urgence immédiatement.

**RARES :**

- Caillots sanguins (risques accrus d'infarctus et de crise cardiaque)
- Diminution de la fonction du rein
- Perforation de l'intestin

- Cicatrisation lente d'une blessure.
- Saignements dans les poumons ou à l'intérieur du corps.
- Réouverture d'une plaie cicatrisée.

- Communiquez IMMÉDIATEMENT avec votre médecin.
- Téléphonez à votre médecin et rendez-vous à l'urgence immédiatement si vous présentez des douleurs graves à l'abdomen accompagnées de nausées, de constipation ou d'autres symptômes.