

FICHE D'INFORMATION SUR LES MÉDICAMENTS
MÉTHADONE

Autres appellations de ce médicament :

Présentation :

La méthadone est une poudre. Le pharmacien préparera à votre intention une solution claire sans saveur à partir de la poudre. La concentration de cette solution peut varier.

Pourquoi devez-vous prendre ce médicament :

La méthadone est utilisée pour le soulagement des douleurs. Elle peut être administrée avec d'autres médicaments analgésiques.

Comment devez-vous prendre ce médicament :

Il importe de prendre la méthadone en respectant attentivement les instructions du médecin. Vous aurez peut-être d'autres médicaments à prendre lorsque la douleur réapparaîtra entre les doses périodiques. Le liquide sans saveur peut être ajouté à des jus de fruits, des boissons à saveur d'agrume (p. ex., Tang^{MD} ou Kool-Aid^{MD}) ou une boisson gazeuse dégazéifiée.

Précautions :

- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, indiquez-le à votre médecin.
- La méthadone peut nuire à vos capacités d'effectuer un travail physique ou mental exigeant de la concentration (p. ex., conduire un véhicule ou utiliser de la machinerie), plus particulièrement au début du traitement.
- Vous NE DEVEZ PAS consommer de boissons alcooliques pendant que vous prenez de la méthadone.
- Mesurez les doses orales de liquides à l'aide d'une seringue ou d'une cuillère à mesurer de pharmacie, étant donné que les mesures domestiques NE SONT PAS toujours exactes.
- Si vous prenez d'autres médicaments, plus particulièrement des produits pouvant provoquer une somnolence (p. ex., médicaments contre l'insomnie, antidépresseurs, médicaments contre les allergies), indiquez-le à votre médecin.
- Si vous avez des difficultés respiratoires graves (asthme), une blessure à la tête ou des troubles épileptiques, indiquez-le à votre médecin.
- Conservez ce médicament dans un endroit frais et sec, *hors de portée des enfants*.

Pour plus de renseignements sur ce médicament, veuillez téléphoner à votre médecin ou à votre infirmière du Centre de cancérologie, ou au pharmacien du Centre régional de cancérologie.

EFFETS SECONDAIRES**PRÉVENTION****CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE****PLUS COURANTS :**

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Étourdissements.
 • Constipation.
 • Nausées, vomissements.
 • Somnolence.
 • Assèchement de la bouche. | <ul style="list-style-type: none"> • Levez-vous et déplacez-vous lentement.
 • Prenez les laxatifs ou les produits amollissants qui vous ont été prescrits. Buvez beaucoup de liquide. • Prenez les médicaments antinauséeux qui vous ont été prescrits. • Les nausées diminuent généralement après un ou deux jours. • Reposez-vous. • La somnolence diminue généralement après un jour ou deux. • Buvez beaucoup de liquide. | <ul style="list-style-type: none"> • Si ces effets secondaires persistent ou vous incommodent, parlez-en à votre médecin ou à votre infirmière. • Si les laxatifs sont inefficaces, parlez-en à votre médecin ou à votre infirmière dès que possible. • Si les médicaments antinauséeux NE SONT PAS efficaces, parlez-en à votre médecin ou à votre infirmière. • Vous NE DEVEZ PAS conduire ou utiliser de la machinerie. • Sucez des bonbons sans sucre ou des morceaux de glace. |
|---|--|--|

MOINS COURANTS :

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Respiration difficile.
 • Vision embrouillée ou dédoublée. • Difficulté ou douleur au moment d'uriner. | <ul style="list-style-type: none"> • Communiquez IMMÉDIATEMENT avec votre médecin. • Parlez-en à votre médecin ou à votre infirmière dès que possible. |
|---|--|

RARES :

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Confusion, hallucinations, somnolence grave.
 • Peau moite et froide, convulsions. • Irrégularités ou ralentissement des pulsations cardiaques. | <ul style="list-style-type: none"> • Communiquez IMMÉDIATEMENT avec votre médecin. • Consultez IMMÉDIATEMENT un médecin. |
|--|--|